

Borreliose

Montag, den 13. September 2010 um 12:40 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 25. Mai 2018 um 17:44 Uhr

40.000 Erkrankungen in Deutschland pro Jahr. Typisch sind rote Ringe, Grippeartige Ganzkörperschmerzen, meningeale Reizung, Herz-Kreislaufbeschwerden.-

'82-'92 in USA: 50.000 x Arthritis. =>Lyme Borreliose-Vaccine von Fa.Baxter 2022 ?
(Fa.Grünenthal, Referat Antibiotika, Postf 500444 52088 Aachen. Lyme-tel: 030/ 2802 3350,Mi.13.30-15 h)

Borrelia

- burgdorferi sensu strictu (USA),
- garinii (Haut) u.
- afzelii (ZNS) in D mit 40 DNA-Subtyp-Proteinoberflächen analysiert. Gefahr: Gebüsch, hohes Gras. Zecken fallen nicht vom Baum.Schutz: Jogginghose, feste Schuhe, Repellens. Bei Schwangerschafts-Infektion keine Indikation zur sectio. Transplazentare IgG-AK, keine IgM-AK. Zecke gegen den Uhrzeigersinn drehend entfernen, Stichstelle 6 Wochen beobachten.

Nested PCR aus Haut, Synovia-Gelenkpunktat. 3x Urin analysieren

Tier-(Veterinär-)-Impfstoff: Merelym / Fa.Merial
